

Chlamydien

- Übertragung durch ungeschützten vaginalen und analen Geschlechtsverkehr
- **Ansteckung bleibt oft unbemerkt.**
- Wird eine Chlamydien-Infektion nicht behandelt, führt sie häufig zu einer Unterleibsentzündung. Diese kann zu Unfruchtbarkeit führen.

Symptome bei Frauen

- Verstärkter Ausfluss
- Unregelmäßige Blutungen
- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr

Schutz

Kondom; die Frau sollte sich bei der Frauenärztin regelmäßig auf Chlamydien untersuchen lassen- man muss die Ärztin danach fragen! Symptome bemerkt man oft nicht, doch die Folgen einer Infektion sind schwerwiegend!!!

Behandlung

Antibiotika und Ruhe; eine Nachuntersuchung ist erforderlich. Nach Möglichkeit sollten alle Sexualpartner (z.B. Stammfreier) zum Arzt geschickt werden, um sich auf Chlamydien untersuchen zu lassen!

Untersuchung der Kunden

Einige Männer haben Ausfluss (klar oder milchig; farblich verschieden); Frage deinen Kunden, ob er Schmerzen oder Stiche beim Wasserlassen spürt. Achte auf Schwellungen am Hoden oder After, auf Rötungen am Harnröhrenaugang.

Das Projekt SXA-Info wird gefördert von:

