

# **Tripper (Gonorrhöe)**

Wird manchmal nicht erkannt, weil es keine Symptome gibt. Die Ansteckung passiert bei Geschlechtsverkehr ohne Kondom (anal und vaginal), selten durch feuchte Gegenstände wie z.B. einen Dildo oder Vibrator.

## **Symptome**

Manchmal gibt es keine Symptome.  
Gelblich-grüner Ausfluss aus der Vagina  
Schmerzen beim Harnlassen  
Schmerzen beim tiefen Eindringen des Penis

## **Schutz**

- Kondome


## **Behandlung**

Antibiotika und Ruhe, in schweren Fällen Krankenhaus. Je früher Tripper erkannt wird, desto einfacher ist die Behandlung. Unbehandelt kann es zu schweren Entzündungen und Unfruchtbarkeit kommen. Tripper kann geheilt werden.

## **Untersuchung der Kunden**

Gelblich-eitriger Ausfluss aus dem Penis  
Die Eichel ist geschwollen und tut weh. Bei Männern die nicht beschnitten sind kann man die Vorhaut nicht zurückziehen. Der Hodensack ist geschwollen und empfindlich.

Weitere Informationen bekommst du bei



**SXA-Info: Information und Beratung für  
Sexarbeiterinnen**

im

**palaver**  
connected

Griesgasse 8  
8020 Graz

 0681 10305868, Michaela

 0699 12262319, Birgit

Wir können dir auch Ärztinnen /Ärzte empfehlen.