


















## Bolile cu transmitere sexuală























Boala	Controlul obligatoriu	Diagnostic	Semne clinice de boală care sunt posibile
Gonoree (Sculament)	La fiecare 6 săptămâni	verficarea mostrei  analiză de urină 	 Secreție gălbuie și mirositor din penis, vagin sau fund  Dureri, mâncărime sau dureri la urinare  Dureri în gât după sex oral
Sifilis (Lues)	La fiecare 12 săptămâni	analiză de sânge 	 Noduri sau ulcere pe penis, vagin, fund sau în gură  Dilatarea ganglionilor limfatici
HIV/SIDA	La fiecare 12 săptămâni	analiză de sânge 	Deseori mult timp fără simptome
Chlamydia	Nu	verficarea mostrei  analiză de urină 	 Secreție gălbuie și mirositoare din penis, vagin sau fund  Dureri, mâncărime sau dureri la urinare  Dureri în gât după sex oral  Dureri la sex
Hepatită B sau C - infecție a ficatului transmisibilă	Nu	analiză de sânge 	 Desori fără simptome Icter/gălbănare

### Informații esențiale:

- Dacă aveți sifilis, gonoree sau HIV pozitiv vi se va reține cartea de sănătate (cartea de control).
- Deasupra este nevoie de controale ginecologice! Controlul obligatoriu nu include de exemplu controlul Papanicolau. Bărbații au nevoie de controale urologice în plus. Recomandarea: minim controlul anual, de exemplu [www.docfinder.at](http://www.docfinder.at)
- Vă rugăm frumos, să vă adresați doctorilor dacă aveți semne de boli.
- Austria are tratamente bune pentru aceste boli.
- Unele boli necesita tratarea partenerilor!
- Există vaccinuri contra cost contra hepatitei B și virusul HPV. Intrebați doctorii!

## Căli de infectare și protecție


-1-

Căli de infectare	Boli posibile	Protecție înainte de infectare
Sex vaginal 	HIV, sifilis, hepatită B și C, gonoree, chlamydia	prezervativ 
Sex anal  	HIV, sifilis, hepatită B și C, gonoree, chlamydia	prezervativ 
Sex oral  	HIV, sifilis, hepatită B și C, gonoree, chlamydia	prezervativ, folie pentru sex oral  
Sărutul  	Sifilis, hepatită B	nu vă sărutați  
Mâna, jucării sexuale  	Sifilis, gonoree, chlamydia	prezervativ, folie pentru sex oral, mănuși din latex   
sânge 	HIV, hepatită B sau C	prezervativ, mănuși din latex, evitați contactul cu sânge   

**Sex oral fără protecție = risc de infecție! (de exemplu sifilis sau HIV,...)**

### Administrarea corectă a prezervativului:

- Penisul trebuie să fie ferm în erecție, când aplicați prezervativul!
- Prepuțul se trage în jos, capătul prezervativului se ține apăsat cu degetele și se aplică pe penis.
- Capătul prezervativului trebuie strâns în timp ce se aplică prezervativul!
- Derulați prezervativul de-a lungul penisului, până la baza penisului
- După ejaculare retragerea penisului trebuie făcută înainte să iasă din erecție, ținând prezervativul la baza penisului.



Dacă aveți **întrebări** adresați-vă la un **centru de consiliere** pentru femei care prestează servicii sexuale! Acolo veți primi ajutor și consiliere **gratuită și anonimă!** Adresele le găsiți în broșura "Sexwork-Info". Această broșură o primiți de exemplu la centrele de control în Austria!

Metodă	Mecanică		Hormonală	Chimică		Naturală
Anticonceptionale	♂ ○ Prezervativ	♀ ○ Diafragmă ○ Diafragmă cu aplicare cervicală	♀ ○ Pilulă ○ Contraceptivele injectabile ○ Plasturele ○ Dispozitivul hormonal ○ Inelul contraceptiv ○ Implantul	♀ ○ Sterilet	♀ ○ Supozitor ○ Creme ○ Comprimate	♀ ○ Măsuratul temperaturi ○ Metoda calendarului
Descriere	A se aplica peste penisul ferm în erecție înainte de actul sexual Previne sarcina și infecții cu transmitere sexuală.	Se plasează înaintea actului sexual pe fundul vaginului astfel încât să acopere colul uterin. Previne să intre spermatozoizii în colul uterin..	Se primește la ginecolog. Previne prin schimbarea hormonilor în corp posibilitatea sarcinii.	Ginecologul aplică în colul uterin. Previne implantarea în ovule fecundate. Înlăturarea de către ginecolog este posibilă. A se schimba după aproximativ 3-5 ani.	Se plasează înaintea actului sexual în vagin. Omoară spermatozoizii.	Prevede zilele fertile și nefertile. Este deasupra nevoie folosirea anticonceptionalelor, de exemplu prezervativul, în zilele fertile.
Siguranța la aplicarea corectă	○ Sexshop ○ Magazin ○ Farmacie	○ Se recomandă vizita la ginecolog ○ Farmacie	○ Este nevoie de o vizită la ginecolog	○ Este nevoie de o vizită la ginecolog	○ Farmacie	
Siguranța la aplicare corectă	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Protecție contra bolilor cu transmitere sexuală	DA	NU	NU	NU	NU	NU

„Pilula de a doua zi“ – doar în caz de urgență: trebuie luată în timp de 72 de ore după contactul sexual neprotejat.- și se da fără rețetă în farmacie sau la ambulanțe ginecologice (în spital). **Nu protejează** împotriva bolilor transmisibile sexual și HIV/SIDA!

**Softtampons (tamponane tip burete): nu protejează** împotriva bolilor transmisibile sexuale, HIV/SIDA, și sarcini nedorite.

**Editorul:** AG Prostitution im Rahmen der Task Force Menschenhandel. Toate specificările în această publicație sunt fără garanție cu totul că au fost cercetate cu atenție. Editorul nu își asumă nici o responsabilitate.

**Sursa de imagini:** Cu autorizarea și suportul Centralei Federale pentru informarea sănătății/ Germania - Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/ Deutschland ([www.bzga.de](http://www.bzga.de)).