

Хламидия

Хламидиалната инфекция се предава чрез незащитен вагинален или анален полов акт.

Много често заразяването остава незабелязано. Ако не се лекува хламидиалната инфекция може да доведе до възпаление на детеродните органи и до стерилност.

Симптоми при жените:

- обилно или неестествено течение
- необичайно кървене
- болки по време на полов акт

Предпазване:

С презарвативи. При редовните гинекологични прегледи трябва да се правят и изследвания за хламидия, попитайте своя гинеколог! Симптомите на инфекцията често остават незабелязани, но последствията може да са сериозни!!!

Лечение:

Антибиотично лечение и почивка, желателно е след лечението да се направи контролен преглед.

При възможност трябва всички сексуални партньори да посетят лекар и бъдат прегледани дали имат хламидиална инфекция.

Преглед на клиентите

Попотай своите клиенти дали имат болки или пробождания при ориниране. Някои мъже имат различен, прозрачен, млекообразен или слузест секрет. Може да следиш за подутини на тестисите или ануса и зачервявания на уретрата.

**За повече информация консултантите на SXA-Info работят за вас
безплатно, анонимно и поверително:**

ромънски, унгарски
0650/59 07 355

словашки, чешки
0681/10 30 58 68

английски, немски
0699/122 623 19

SXA Info wird finanziert von:

